infezione SEPSI

Servizio Sanitario della Toscana

SOSPETTALA

MEWS

Cognome ..... Nome ..... Data di nascita ..... Luogo di nascita ..... Età .....

	3	2	1	0	1	2	3	Valore
Frequenza Respiratoria		< 9		9 - 14	15 - 20	21 - 29	> 30	.....
Frequenza Cardiaca		< 40	41 - 50	51 - 100	101 - 110	111 - 129	> 130	.....
Pressione Arteriosa Sistolica	< 70	71 - 80	81 - 100	101 - 199		> 200		.....
Livello di Coscienza				Vigile	Risponde alla voce	Risponde al dolore	Non risponde	.....
Temperatura corporea (°C)		< 35		35 - 38,4		> 38,5		.....

Comorbidità — Totale .....

Modified early warning score predicts the need for hospital admission and inhospital mortality
V. C. Burch, G. Tarr, C. Morroni. Emerg. Med. J. 2008;25:674-678
Impaginazione a cura del Centro GRC - Regione Toscana

GRC

qSOFA



Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment Score

	SCORE				
System	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Respiration PaO2/FIO2, mmHg	>=400	<400	<300	<200 with respiratory support	<100 with respiratory support
Coagulation Platelets, x103/µL	>=150	<150	<100	<50	<20
Liver Bilirubin, mg/dL	<1.2	1.2-1.9	2.0-5.9	6.0-11.9	>12.0
Cardiovascular	MAP >=70 mmHg	MAP <70 mmHg	Dopamine <5 or dobutamine (any dose)[a]	Dopamine 5.1-15 or epinephrine =<0.1 or norepinephrine =<0.1[a]	Dopamine >15 or epinephrine >0.1 or norepinephrine >0.1[a]
Central nervous system Glasgow Coma Scale score[b]	15	13-14	10-12	6-9	<6
Renal Creatinine, mg/dl	<1.2	1.2-1.9	2.0-3.4	3.5-4.9	>5
Urine output, mL/die				<500	<200

Abbreviations: FIO2 Fraction of inspired oxygen; MAP mean arterial pressure; PaO2 Partial pressure of oxygen.
a Catecholamine doses are given as µg/kg/min for at least 1 hour. / **b** Glasgow Coma Scale score range from 3-15; higher score indicates better neurological function.

1

2

3

IDENTIFICA E BONIFICA IL FOCOLAIO INFETTIVO

AGISCI

1. LATTATO (... PCT)
2. EMOCOLTURE
3. TERAPIA ANTIBIOTICA
   empirica > mirata
4. SOMMINISTRA LIQUIDI
5. SOMMINISTRA O_2
6. MONITORA DIURESI

entro la 1ª ora