

**Obiettivo “MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI”**

L’obiettivo “Miglioramento degli esiti” prevede i seguenti due indicatori:

1. gestione delle criticità: ridurre il rischio di morte rispetto al benchmark regionale
2. governo delle reti cliniche: ridurre la variabilità territoriale, mantenendo o migliorando gli indicatori di esito

**Indicatore 1**

Gestione delle criticità mediante analisi delle problematiche di esito da **Programma regionale di Osservazione degli Esiti** (PrOsE – ARS Toscana) e mantenimento o miglioramento degli esiti rispetto all’ultimo triennio per erogatore.

La verifica avverrà con riferimento al raggiungimento degli indicatori di seguito riportati.

<b>Azienda sanitaria</b>	<b>Struttura</b>	<b>Indicatore</b>		<b>Peso</b>
<b>ASL Toscana centro</b>	Riuniti Pistoia	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall’ammissione	Ridurre	1%
	Osp.San Giuseppe	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall’ammissione	Ridurre	1%
	Osp.San Giuseppe	Scompenso CC, rischio di morte a 30 giorni dall’ammissione	Ridurre	1%
<b>AOU Careggi</b>	AOU Careggi	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache, rischio di morte a 30 giorni dall’intervento	Mantenere	1,5%
	AOU Careggi	Intervento chirurgico per K cerebrale, rischio di morte a 30 giorni dall’intervento di craniotomia.	Mantenere	1%
	AOU Careggi	Bypass aortocoronarico, rischio di morte a 30 giorni dall’intervento	Mantenere	1,5%
<b>ASL Toscana nord-ovest</b>	Civile Carrara	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall’ammissione	Ridurre	0,75%
	Riuniti Livorno	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall’ammissione	Ridurre	0,75%
	Osp.Unico della Versilia	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall’ammissione	Ridurre	0,75%
	Civile Piombino	Scompenso CC, rischio di morte a 30 giorni dall’ammissione	Ridurre	0,75%
<b>AOU Pisana</b>	AOU Pisana	Bypass aortocoronarico, rischio di morte a 30 giorni dall’intervento	Mantenere	1%
	AOU Pisana	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache, rischio di morte a 30 giorni dall’intervento	Ridurre	2%
	AOU Pisana	Intervento chirurgico per K cerebrale, rischio di morte a 30 giorni dall’intervento di craniotomia.	Mantenere	1%
<b>ASL Toscana sud-est</b>	SM della Gruccia-Osp.del Valdarno	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall’ammissione	Ridurre	1%
	Osp.Riuniti della Val di chiana	Scompenso CC, rischio di morte a 30 giorni dall’ammissione	Ridurre	1%
	Civile Bibbiena	Parto, percentuale di parti cesarei primari	Ridurre	1%

<b>AOU Senese</b>	AOU Senese	BPCO riacutizzata, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione	Ridurre	1%
	AOU Senese	Scompenso CC, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione	Ridurre	1%
	AOU Senese	Bypass aortocoronarico, rischio di morte a 30 giorni dall'intervento	Mantenere	0,66%
	AOU Senese	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache, rischio di morte a 30 giorni dall'intervento	Mantenere	0,66%
	AOU Senese	Intervento chirurgico per K cerebrale, rischio di morte a 30 giorni dall'intervento di craniotomia.	Mantenere	0,66%
<b>Fondazione Gabriele Monasterio</b>	FTGM	Bypass aortocoronarico, rischio di morte a 30 giorni dall'intervento	Mantenere	2%
	FTGM	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache, rischio di morte a 30 giorni dall'intervento	Mantenere	2%

## Indicatore 2

**Governo delle reti cliniche:** ridurre la variabilità territoriale, mantenendo o migliorando gli esiti per i residenti delle zone distretto. Questi obiettivi sono condivisi da AUSL, AOU e AV. Questi obiettivi saranno monitorati e valutati con riferimento al programma regionale di osservazione degli esiti (PrOsE).

**IMA, rischio di morte a 30 giorni dall'ammissione:** mantenere o ridurre rispetto all'ultimo triennio.

Azienda USL	Zona Distretto	Obiettivo	Peso			
			ASL	AOU	FTGM	Dir.Progr. AV
<b>ASL Toscana sud-est</b>	Alta val d'elsa	Mantenere	0,1%	0,1%		0,1%
	Amiata grossetana	Mantenere	0,1%	0,1%		0,1%
	Amiata senese e Val d Orcia	Mantenere	0,1%	0,1%		0,1%
	Aretina	Mantenere	0,1%	0,1%		0,1%
	Casentino	Ridurre	0,25%	0,25%		0,25%
	Colline dell'albegna	Ridurre	0,25%	0,25%		0,25%
	Colline metallifere	Mantenere	0,1%	0,1%		0,1%
	Grossetana	Ridurre	0,25%	0,25%		0,25%
	Senese	Mantenere	0,1%	0,1%		0,1%
	Val di Chiana aretina	Ridurre	0,25%	0,25%		0,25%
	Val di chiana senese	Mantenere	0,1%	0,1%		0,1%
	Val tiberina	Mantenere	0,1%	0,1%		0,1%
	Valdarno	Ridurre	0,25%	0,25%		0,25%

<b>ASL Toscana nord-ovest</b>	Alta val di cecina	Mantenere	0,125%	0,125%	0,25%	0,125%
	Apuane	Mantenere	0,125%	0,125%	0,25%	0,125%
	Bassa val di cecina	Mantenere	0,125%	0,125%	0,25%	0,125%
	Elba	Ridurre	0,25%	0,25%	0,5%	0,25%
	Livornese	Mantenere	0,125%	0,125%	0,25%	0,125%
	Lunigiana	Ridurre	0,25%	0,25%	0,5%	0,25%
	Piana di lucca	Mantenere	0,125%	0,125%	0,25%	0,125%
	Pisana	Ridurre	0,25%	0,25%	0,5%	0,25%
	Val d'era	Mantenere	0,125%	0,125%	0,25%	0,125%
	Val di cornia	Ridurre	0,25%	0,25%	0,5%	0,25%
	Valle del serchio	Mantenere	0,125%	0,125%	0,25%	0,125%
	Versilia	Mantenere	0,125%	0,125%	0,25%	0,125%
<b>ASL Toscana centro</b>	Empolese	Mantenere	0,16%	0,16%		0,16%
	Fiorentina	Ridurre	0,33%	0,33%		0,33%
	Fiorentina Nord-Ovest	Mantenere	0,16%	0,16%		0,16%
	Fiorentina Sud-Est	Mantenere	0,16%	0,16%		0,16%
	Mugello	Mantenere	0,16%	0,16%		0,16%
	Pistoiese	Mantenere	0,16%	0,16%		0,16%
	Pratese	Ridurre	0,33%	0,33%		0,33%
	Val di nievole	Ridurre	0,33%	0,33%		0,33%
	Valdarno inferiore	Mantenere	0,16%	0,16%		0,16%

**BPCO riacutizzata, rischio di riammissione a 30 giorni dalla dimissione:** mantenere o ridurre rispetto all'ultimo triennio.

<b>Azienda USL</b>	<b>Zona Distretto</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>
--------------------	-----------------------	------------------	-------------

<b>ASL Toscana sud-est</b>	Alta val d'elsa	Ridurre	0,125%
	Amiata grossetana	Mantenere	0,05%
	Amiata senese e Val d Orcia	Mantenere	0,05%
	Aretina	Ridurre	0,125%
	Casentino	Mantenere	0,05%
	Colline dell'albegna	Mantenere	0,05%
	Colline metallifere	Mantenere	0,05%
	Grossetana	Ridurre	0,125%
	Senese	Mantenere	0,05%
	Val di Chiana aretina	Mantenere	0,05%
	Val di chiana senese	Ridurre	0,125%
	Val tiberina	Mantenere	0,05%
	Valdarno	Mantenere	0,05%
<b>ASL Toscana nord-ovest</b>	Alta val di cecina	Ridurre	0,125%
	Apuane	Ridurre	0,125%
	Bassa val di cecina	Mantenere	0,07%
	Elba	Mantenere	0,07%
	Livornese	Mantenere	0,07%
	Lunigiana	Mantenere	0,07%
	Piana di lucca	Mantenere	0,07%
	Pisana	Mantenere	0,07%
	Val d'era	Ridurre	0,125%
	Val di cornia	Mantenere	0,07%
	Valle del serchio	Mantenere	0,07%
Versilia	Mantenere	0,07%	
<b>ASL Toscana centro</b>	Empolese	Ridurre	0,15%
	Fiorentina	Mantenere	0,1%
	Fiorentina Nord-Ovest	Mantenere	0,1%
	Fiorentina Sud-Est	Mantenere	0,1%
	Mugello	Mantenere	0,1%
	Pistoiese	Mantenere	0,1%
	Pratese	Ridurre	0,15%
	Val di nievole	Mantenere	0,1%
Valdarno inferiore	Mantenere	0,1%	
<b>Aziende ospedaliero-universitarie</b>	AOU Pisana	Ridurre	2%
	AOU Senese	Mantenere	2%
	AOU Careggi	Mantenere	2%

